



Drontal[®] Chien XL

NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Drontal Chien XL 525/175/175 mg

COMPOSITION

Un comprimé contient :

Substances actives :

Fébanel	525 mg
Pyrantel	175 mg
(équivalent à 504 mg d'émbonate de pyrantel)	
Praziquantel	175 mg

Comprimé marron clair à marron, en forme d'os avec une barre de sécabilité sur les deux faces, permettant de diviser le comprimé en deux parties égales.

ESPECES CIBLES

Chiens

INDICATIONS D'UTILISATION

Traitements des infestations mixtes par les nématodes et les cestodes suivants :

Vers ronds :

Ascarides (adultes matures et immatures) :

Toxocara canis, *Toxascaris leonina*

Ankylostomes (adultes) :

Uncinaria stenocephala, *Ancylostoma caninum*

Trichocéphales (adultes) :

Trichuris vulpis

Vers plats (adultes matures et immatures) :

Echinococcus granulosus,

Echinococcus multilocularis,

Dipylidium caninum,

Taenia spp.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

Ne pas utiliser pendant le premier et le deuxième tiers de gestation (voir rubrique « Mises en gardes particulières »).

MISES EN GARDES PARTICULIÈRES

Mises en gardes particulières :

Les puces servent d'hôtes intermédiaires pour un type commun de vers plat (ténia), *Dipylidium caninum*. Une réinfestation par les vers plats est inévitée en l'absence de mesures de lutte contre les hôtes intermédiaires comme les puces, les souris, etc.

Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles :

L'utilisation fréquente et répétée d'anthelminthiques d'une même classe peut conduire au développement d'une résistance aux anthelminthiques de cette classe.

Pour minimiser le risque de réinfestation et d'infestations d'autres animaux, les fèces doivent être ramassées et éliminées de manière appropriée pendant les 24 heures suivant le traitement.

Les comprimés sont aromatisés. Afin d'éviter toute ingestion accidentelle, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Par mesure d'hygiène, il convient de se laver les mains après avoir manipulé les comprimés.

Autres précautions :

Ce médicament contenant du praziquantel, il est efficace contre *Echinococcus* spp., un parasite qui n'est pas présent dans tous les états membres de l'UE mais dont la fréquence augmente dans certains d'entre eux. L'échinococcose représente un danger pour l'homme et est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). En cas de suspicion d'échinococcose, les recommandations spécifiques pour le traitement et le suivi et pour la sécurité des personnes sont à demander à l'autorité compétente concernée.

Gestation et lactation :

Des effets tératogènes attribués au fébanel administré à des doses élevées dans les premiers stades de gestation ont été observés chez les rats, les moutons et les chiens.

L'innocuité du médicament pendant les premiers et deuxième tiers de gestation n'a pas été étudiée. Ne pas utiliser durant les premiers et deuxième tiers de gestation (voir rubrique « Contre-indications »).

L'innocuité d'un traitement unique dans le dernier tiers de gestation ou durant la lactation a été démontrée.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions :

Les effets anthelminthiques de ce médicament et des produits contenant de la pipérazine peuvent être antagonisés en cas d'utilisation concomitante.

L'utilisation concomitante avec d'autres agonistes cholinergiques peut entraîner une toxicité.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Aucun effet indésirable n'a été observé chez les chiens et les chiots après l'administration de 10 fois la dose recommandée.

EFFETS INDÉSIRABLES

Chiens :

Très rare (< 1 animal/10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) :	Troubles de l'appareil digestif (par exemple, vomissements et diarrhée) Anorexie (perte d'appétit), Léthargie Hyperactivité
--	--

¹ Légers et transitoires.

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament. Si vous constatez des effets indésirables, même ceux ne figurant pas sur cette notice, ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez contacter en premier lieu votre vétérinaire.

Vous pouvez également notifier tout effet indésirable au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché en utilisant les coordonnées figurant à la fin de cette notice, ou par l'intermédiaire de votre système national de notification : Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (ANMV).

Site internet : <https://pharmacovigilance-anmv.anses.fr/>

POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale uniquement.

Posologie

Pour le traitement des chiens, 1 comprimé pour 35 kg de poids corporel (15 mg de fébanel, 14,4 mg d'émbonate de pyrantel et 5 mg de praziquantel par kg de poids corporel).

Les posologies sont les suivantes :

Poids de l'animal (kg)	Nombre de comprimés
7 - 17,5	½
> 17,5 - 35	1
> 35 - 52,5	1 ½
> 52,5 - 70	2

Administrer un demi-comprimé supplémentaire par intervalle supplémentaire de 17,5 kg de poids corporel.

Mode d'administration et durée du traitement

Les comprimés sont aromatisés et des études ont montré qu'ils sont appétents et pris volontairement par la majorité (environ 9 sur 10) des chiens testés.

Les comprimés doivent être donnés en une seule fois.

Demander l'avis d'un vétérinaire sur la nécessité de renouveler un traitement et sur la fréquence des traitements.

Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 7 kg.

Pour garantir un dosage correct, il convient de déterminer le poids de l'animal aussi précisément que possible.

INDICATIONS NÉCESSAIRES À UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Les comprimés peuvent être administrés avec ou sans nourriture.

Il n'est pas nécessaire de restreindre l'accès à la nourriture avant ou après le traitement.

TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament vétérinaire ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte et sur la plaquette après Exp. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

Les demi-comprimés non utilisés doivent être éliminés immédiatement ou remplacés dans leur plaquette d'origine. Durée de conservation des demi-comprimés : 7 jours.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Utiliser des dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable. Ces mesures devraient contribuer à protéger l'environnement.

Demandez à votre vétérinaire ou à votre pharmacien comment éliminer les médicaments dont vous n'avez plus besoin.

CLASSIFICATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRIAIRES

Médicament vétérinaire soumis à ordonnance, sauf pour certaines présentations.

NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET PRÉSENTATIONS

FR/V/9080066 9/2017

Présentations : Boîtes contenant 2, 4, 8, 24, 48 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

DATE À LAQUELLE LA NOTICE A ÉTÉ RÉVISÉE POUR LA DERNIÈRE FOIS

01/2025

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données de l'Union sur les médicaments (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

COORDONNÉES

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et coordonnées pour notifier les effets indésirables présumés :

Vetoquinol S.A
Magny-Vernois
70200 Lure
France
Tél : +33 3 84 62 55 55

Fabricants responsables de la libération des lots :

- KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Allemagne
- EUROPHARTECH, 34 rue Henri Matisse, 63370 Lempdes, France

504836 1224 D